

Generel vejledning til operation i lokalbedøvelse

Før operationen

HVIS De har pacemaker, er i behandling med blodfortyndende medicin (f.eks. Marevan eller lignende) skal dette oplyses i god tid før operationen.

Undlad at smøre creme på huden. Eventuelt hår fjernes dagen før med en barbermaskine i et område omkring operationsstedet.

Operationen

Huden desinficeres med klorhexidinsprit. Lokalbedøvelsen sprøjtes ind under huden med en tynd nål. Det svier og spænder i få sekunder. Man kan ved operationen ofte mærke berøring, men ikke smerte. Såret lukkes med en tråd, der oftest skal fjernes efter 7-10 dage på klinikken eller hos Deres praktiserende læge.

Efter operationen

Mod smerter: lokalbedøvelsen holder i 2-6 timer.

Med mindre andet er aftalt, kan der mod smerte tages almindelige håndkøbspræparater Paracetamol, Kodimagnyl, eller evt. Ibuprofen).

Forbinding: forbindingen/plastret fjernes/skiftes efter aftale.

Restriktioner: med mindre andet er aftalt, er der ingen restriktioner i, hvad man må. Dog må de ikke gå i svømmehallen eller lignende før trådene er fjernet.

Komplikationer

I sjældne tilfælde kommer der blodansamling, som oftest forsvinder af sig selv efter nogle dage til uger. I yderst sjældne tilfælde kommer der betændelse.

I meget sjældne tilfælde bliver ar grimme eller fortykkede.

I yderst sjældne tilfælde udvikles overfølsomhedsreaktion mod lokalbedøvelse, dette kræver hurtig behandling eller eventuel indlæggelse på hospital.

Søg læge

Ved større blødning, blodansamling eller tegn på betændelse (rødme, varme, hævelse, temperatur over 38,5) kontaktes klinikken eller telefon 1813.