

Operation i og omkring endetarmsåbningen

Operation i eller omkring endetarmsåbningen foretages f.eks, hvis man skal fjerne større hæmoroider, løs hud efter hæmoroider (marisk), bylder eller behandle en kronisk revne i endetarmsåbningen, som ikke heler på medicinsk behandling.

Før operationen

Man kan med fordel smøre lokalbedøvende creme EMLA omkring endetarmen 1-2 timer før operationen. Man vil som regel kunne køre hjem selv efter operationen.

Operationen

Operationen udføres i lokalbedøvelse, som anlægges via et stik omkring hæmoroiderne eller i omgivelserne til endetarmsåbningen.

Efter operationen

Mod smerter: de første 2-3 dage efter nogle operationer er smertefulde, hvorfor man med fordel vil kunne blødgøre afføringen for at lette passagen igennem operationssåret (svesker, Laktulose mixtur, Magnesia). Mod smerter kan tages Paracetamol, Kodimagnyl eller Ibuprofen, med mindre andet er aftalt.

Forbinding: eventuel forbinding fjernes dagen efter operationen. Operationssårene rengøres bedst ved at skylle med en håndbruser to gange daglig og efter toiletbesøg, indtil operationsområdet er smertefrit. Eventuelt kan kolde omslag anvendes både for at standse blødning og reducere smerter. Der skal ikke fjernes sting.

Sygemelding: efter nogle operationer kan sygemelding være nødvendig i 3-5 dage.

Komplikationer

Blødning er meget sjældent, og infektion er yderst sjældent.

Søg læge

Ved større blødning eller tegn på betændelse skal klinikken, vagtlægen eller skadestuen straks kontaktes.